

OVER DRIE NIEUWE SOORTEN

VAN

TETRAÖDON VAN DEN INDISCHEN ARCHIPEL

DOOR

Dr. P. BLEEKER.

In eene verhandeling over de Blootkakige visschen van den Soenda-Molukschen Archipel, ingezonden voor het 2^{de} deel der werken van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen heb ik alle soorten van Gymnodonten mijner verzameling, thans 15 in getal (1), beschreven en daarbij eenige opmerkingen gevoegd over de geographische verbreiding dezer visschen in den Indischen Archipel en over de wensche-lijke onderverdeelingen van het geslacht Tetraödon. Ik zal hier ter plaatse slechts mededeelen de diagnosen van drie, voor zoo verre mij bekend is, nog nergens beschreven soorten van Tetraödon.

Tetraödon calamaroides Blkr.

Tetr. corpore oblongo compresso, altitudine $4\frac{1}{2}$, latitudine $6\frac{1}{2}$ in ejus longitudine; capite obtuso 4 circiter in longitudine corporis; linea rostro-frontali declivi rectiuscula; oculis superis diametro 10 circiter in longitudine capitis, diametris 4 circiter distantibus; papillis nasalibus utroque latere 2 conicis basi unitis; maxilla superiore prominente; capite corporeque totis spinulis scabris; labiis, rostro, basibus pinnarum et parte caudae

(1) Tetr. patoca Ham. Buch., Tetr. oblongus Bl., Tetr. lunaris Cuv., Tetr. papua Blkr., Tetr. testudineus Bl., Tetr. calamara Russ. Rüpp., Tetr. calamaroides Blkr., Tetr. kappa Russ., Tetr. Kunhardtii Blkr., Tetr. potamophilus Blkr., Tetr. leirus Blkr., Tetr. reticulatus Blkr., Tetr. modestus Blkr., Diodon punctatus Cuv., Triodon bursarius Reinw.

posteriore lævibus; linea laterali inconspicua; pinnis dorsali et anali sub-fabelliformibus, circiter æque altis ac latis, obtusis rotundatis; caudali convexa; corpore superne griseo-coerulescente inferne flavescente, superne lateribusque maculis nigris sparsis polymorphis, inferne maculis griseis; rostro genisque nigro vittatis; ano annulo nigro cincto; pinnis viridibus, pectoralibus basi nigris, dorsali, anali caudalique nigro subreticulatis.

D. 1/10. P. 2/17. A. 1/11. C. 10 et lat. brev.

Synon. *Ikan Buntak Kalappa*, Mal. Batav.

Habit. Batavia, in mari.

Longitudo speciminis unici 500".

Tetraödon Kunhardtii Blkr.

Tetr. corpore oblongo antice cylindraceo postice compresso, altitudine 5 circiter in ejus longitudine; capite obtuso 4 fere in longitudine corporis; linea rostro-frontali convexa; oculis superis, diametro 3 ad 4 in longitudine capitis, diametro 1 ad $1\frac{1}{2}$ distantibus; papillis nasalibus oblongis utroque latere 2 basi unitis; maxilla superiore prominente; vertice, dorso antice ventreque spinulis scabris; rostro, fronte, operculis, dorso postice, lateribus totis caudaque glabris; linea laterali vix conspicua; pinnis dorsali et anali altioribus quam latis rotundatis, caudali convexa; corpore superne nigricante-viridi, lateribus maculis diffusis dilutioribus, inferne argenteo; pinnis viridescensibus, caudali postice nigricante.

D. 2/8. P. 2/15. A. 2/6 vel 2/7. C. 8 et lat. brev.

Habit. Padaug, Sumatræ occidentalis, in mari.

Longitudo 5 speciminum, a doctissimo O. Kunhardt, medico militari 1 classis miss. 60" ad 110".

Tetraödon leiurus Blkr.

Tetr. corpore oblongo depresso antice latiore quam alto, latitudine 4 ad $4\frac{1}{2}$ in longitudine; capite obtuso depresso 3 ad $3\frac{1}{4}$ in longitudine corporis; linea rostro-frontali declivi rectiuscula vel convexiuscula; oculis posteris diametro $4\frac{1}{2}$ circiter in longitudine capitis, diametris 2 ad 3 distantibus; papillis nasalibus oblongis utroque latere unica apice bifida; vertice, operculis, dorso, lateribus ventreque totis spinulis armatis; rostro caudaque glabris; linea laterali inconspicua; pinnis dorsali et anali aequè altis circiter ac latis obtusis rotundatis; caudali convexa; corpore superne fuscescente-rufo immaculato, inferne flavescente; pinnis rufescentibus vel flavescentibus.

D. 3/11. P. 1/21 vel 1/22 vel 2/20. A. 2/9. C. 10 et lat. brev.

Synon. *Ikan Buntak*, Mal. Batav.

Habit. Batavia, in mari et ostiis fluviorum,

Longitudo 5 speciminum 60" ad 98".